

# ПРОБЛЕМИ С ХРАНОСМИЛАНЕТО И ХОМЕОПАТИЯ



## ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ОСТЪР ГАСТРОЕНТЕРИТ

1. от грешки в диетата
2. консумация на недобре съхранявана храна
3. "ваканционен" гастроентерит

**Arsenicum album 9CH**

- ◇ Остър гастроентерит
- ◇ Пареща диария
- ◇ Астения, тревожност

3-4 пъти  
по 5 гранули

## ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С ХРАНИ, АЛКОХОЛ, ПОДПРАВКИ

**Nux vomica 15CH**

- ◇ Злоупотреба с алкохол и пикантни храни


3-4 пъти  
по 5 гранули заедно  
или поотделно

**Antimonium crudum 9CH**



- ◇ Диспепсия след преяждане

# ЧЕСТО СРЕЩАНИ СИМПТОМИ ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА




## ЧЕСТИ ОРИГВАНИЯ

 Asa foetida 5CH	◇ Шумни оригвания и спазми на хранопровода	3 пъти по 5 гранули
--	--	---------------------










## КИСЕЛИНИ И ПАРЕНЕ

 Robinia pseudo-acacia 5CH	◇ Гастроезофагеален рефлукс	по 5 гранули 3 пъти дневно от всяко
 Iris versicolor 9CH	◇ Киселинна диспепсия, повръщане на парещо кисело съдържимо	

## СТОМАШЕН ДИСКОМФОРТ С ПОДУВАНЕ И БАЛОНИРАНЕ

 Antimonium crudum 9CH	◇ Балониране след преяждане	3 пъти по 5 гранули
 China rubra 9CH	◇ Зловонни газове след консумация на плодове или мляко	3 пъти по 5 гранули
 Carbo vegetabilis 9CH	◇ Изразена флатулентност след злоупотреба с храна или алкохол	3 пъти по 5 гранули

## СКЛОННОСТ КЪМ ХРОНИЧЕН ЗАПЕК

 Lycopodium 9CH	◇ Чести, неефикасни позиви	по 5 гранули дневно
 Alumina 9CH	◇ Ленивост на дебелото черво	2 пъти по 5 гранули
 Bryonia 9CH	◇ Запек при хора в напреднала възраст	
 Bryonia 9CH	◇ Твърди, сухи изпражнения	3 пъти по 5 гранули
 Causticum 15CH	◇ Изискват се големи усилия за изхождането им	
 Causticum 15CH	◇ Паретични смущения	3 пъти по 5 гранули
 Opium 5CH	◇ При възрастни хора и малки деца при приучаването им за ходене на гърне	
 Opium 5CH	◇ Чревна пареза, хроничен запек	3 пъти по 5 гранули
 Opium 5CH	◇ За възстановяване на перисталтиката	

## НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ХРАНЕНЕ стомашни болки, тежест, парене, гастроезофагеален рефлукс

### GASTROCYNESINE®

По 1-2 таблетки четвърт час преди хранене.  
Приемът може да се повтори след нахранване.  
Таблетки, опаковка по 60 бр.

