

ГРИП И ДРУГИ ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ



**ПРОФИЛАКТИЧНО,
ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН**

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

◇ По 1 доза седмично

ПРИ КОНТАКТ С БОЛЕН

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

◇ По 1 доза на всеки от контактните



ФЕБРИЛИТЕТ С ОСТРО НАЧАЛО

ПРИ ПЪРВИТЕ СИМПТОМИ - ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®!

По 1 доза възможно най-рано, повтаря се през 6 часа до настъпване на подобрение.



В ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛИНИЧНАТА КАРТИНА ЗАЕДНО С:

- ◇ Много бързо повишаване до 39-40°, след излагане на студ
- ◇ Платовидна температурна крива
- ◇ Липса на изпотяване
- ◇ Кожата е зачервена и суха
- ◇ Силна жажда за студена вода
- ◇ Рязко начало, променлива температура с покачване до 40°
- ◇ Обилно изпотяване, зачервено лице
- ◇ Чувствителност на сетивните органи: непоносимост към шум, допир, ярка светлина

Aconitum napellus 9CH

по 5 гранули на всеки час,
приемите се разреждат при подобрение

Belladonna 9CH

по 5 гранули на всеки час,
приемите се разреждат при подобрение

ФЕБРИЛИТЕТ С ПОСТЕПЕННО НАЧАЛО И ПРИ ВЕЧЕ ИЗЯВЕНА КЛИНИЧНА КАРТИНА

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

По 1 доза сутрин и вечер.



В ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛИНИЧНАТА КАРТИНА ЗАЕДНО С

- ◇ Субфебрилитет (37.5-38°),
- ◇ Фебрилитет с нехарактерна клинична картина
- ◇ Втрисане, обща скованост
- ◇ Липса на жажда, въпреки температурата
- ◇ Болният е отпуснат, леко унесен
- ◇ Силно главоболие, астения

Ferrum phosphoricum 9CH

по 5 гранули два пъти дневно

Gelsemium 9CH

по 5 гранули на 4 часа

- ◇ Схващане на цялото тяло, подобряващо се от раздвижване
- ◇ Силна жажда за вода или студено мляко
- ◇ Фебрилитет + херпес

Rhus toxicodendron 9CH

по 5 гранули на 4 часа

ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА С МУСКУЛНИ БОЛКИ, ВТРИСАНЕ, ГЛАЗОБОЛИЕ PARAGRIPPE®

По 2 таблетки на всеки час.
Приемите се разреждат при подобрение.

Таблетки за смучене, опаковка по 60 бр.

