

# ЛЯТО И ХОМЕОПАТИЯ



## ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИ СЛЪНЧЕВА АЛЕРГИЯ

**Hypericum perforatum 15CH** ◇ Във връзка с фотосенсибилизацията  
ефект на жълтия кантарион

по 5 гранули  
сутрин и вечер

**Poumon histamine 15CH** ◇ За лечение на atopичния терен

по 5 гранули на обед

Един месец преди излагане на слънце и по време на излагане на слънце

## ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИ СЛЪНЧЕВА АЛЕРГИЯ, ПРОЯВЯВАЩА СЕ НА МОРЕ

**Natrum muriaticum 15CH** ◇ Слънчева алергия на море

по 5 гранули  
сутрин и вечер

Заедно с **HYPERICUM PERFORATUM 15CH** и **POUMON HISTAMINE 15CH**

Един месец преди излагане на слънце и по време на излагане на слънце на море

## ПРИ ПРОЯВЕНА СЛЪНЧЕВА АЛЕРГИЯ

**Muriaticum acidum 9CH** ◇ Папуло-везикулозен обрив, сърбеж

по 5 гранули  
на всеки час

Заедно с **APIS MELLIFICA 15CH**

## СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРЯНИЯ 1<sup>ВА</sup> СТЕПЕН

Apis mellifica 15CH

◇ Зачервяване, оток, парене

по 5 гранули  
на всеки час

## УЖИЛВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ

### ПРОФИЛАКТИЧНО

◇ По време на престой в зони с много насекоми (комари, оси, стършели)

Ledum palustre 9CH

по 5 гранули сутрин и вечер

### ПРИ УЖИЛВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ

◇ Розов оток с бокчане и парене  
◇ Подобрение от студен компрес

Apis mellifica 15CH

по 5 гранули на всеки час до подобрение

## ПРИ КОНТАКТ С МЕДУЗА

Urtica urens 5CH

◇ Уртикария със сърбеж  
◇ Влошаване при контакт със студена вода

по 5 гранули  
на всеки час

## ПРИ ИРИТАТИВНИ ДЕРМАТИТИ

леки изгаряния, подсичане, зачервяване, рагади, охлузвания **HOMEOPLASMIN®**

Тънък слой от мазта се нанася от 1 до 3 пъти дневно.



Маз, туба 40 гр.

## СЕЗОННИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ СМУЩЕНИЯ, ОСТЪР ГАСТРОЕНТЕРИТ

Arsenicum album 15CH

◇ Пареща диария, астения, тревожност

по 5 гранули  
4 пъти дневно

### СПОРЕД СИМПТОМАТИКАТА ЗАЕДНО С:

#### при диария

◇ Изтощителна диария при прием на мляко и плодове

China rubra 5CH

◇ При злоупотреба с плодове или хранителна интоксикация

Podophyllum 9CH

◇ След прием на течности/храна

Aloe 9CH

по 5 гранули от 3-те през час,  
приемите се разреждат при подобрение

#### при гадене и повръщане

◇ Придружени с хиперсаливация

Ipecac 9CH

◇ След преяждане или злоупотреба с алкохол

Nux vomica 9CH

по 5 гранули от 2-те през час,  
или според ритъма на гаденето и повръщането

#### при коликообразни болки

◇ Колики с изразена астения

Cuprum metall. 9CH

◇ Крамповидни болки с гадене и повръщане

Colocynthis 9CH

по 5 гранули от 2-те през 15-20 мин.  
приемите се разреждат при подобрение